

## BIENVENIDO A LA NUEVA FORMA DE CONTROLAR LA ILEÍTIS

- La primera vacuna inyectable del mundo contra *L. intracellularis*
- Vacunación individual
- Dosis única
- Protección prolongada



Para mayor información contacte a su representante MSD Salud Animal. Consulte al Médico Veterinario. Para uso exclusivo del Médico Veterinario.

### MSD Salud Animal

Intervet México, S.A. de C.V.  
Av. San Jerónimo 369. Colonia La Otra Banda, Del. Álvaro Obregón.  
C.P. 01090 Ciudad de México. Tel. (55) 54819600  
www.msd-salud-animal.mx

GL/ILE/0218/0003A

©2018 Intervet International B.V., also known as MSD Animal Health.  
All rights reserved.



Reg. SAGARPA B-0273-282

**BACTERINA PARA EL CONTROL DE LA ILEÍTIS CAUSADA POR *Lawsonia intracellularis* EN CERDOS. FÓRMULA:** Cada dosis de 2ml contiene: Cultivos inactivados de *Lawsonia intracellularis*, SPAHD8: 1.2 RP\*. Vehículo c.b.p 2 ml \*Potencia Relativa. **DESCRIPCIÓN:** Porcilis® ILEITIS es una bacterina inactivada contra la enteritis proliferativa porcina. La vacuna contiene células inactivadas de *L. intracellularis* en un adyuvante de aceite en agua. Las células bacterianas de *L. intracellularis* utilizadas para la fabricación de Porcilis® ILEITIS se producen mediante un co-cultivo de la cepa de producción de *L. intracellularis* en una línea celular McCoy. Una vez cultivadas, las células McCoy son concentradas, sometidas a sonificación e inactivadas con etilénimina binaria. El antígeno es adicionado en un adyuvante. **INDICACIONES:** Porcilis® ILEITIS está indicada para utilizarse en cerdos sanos de 3 semanas de edad o mayores como auxiliar para controlar la ileítis causada por *Lawsonia intracellularis*, para reducir la colonización de *Lawsonia*, así como para disminuir la duración de la excreción fecal. Se ha demostrado que la duración de la inmunidad supera las 20 semanas. **ESPECIES DE DESTINO:** Porcinos. **FORMA FARMACÉUTICA:** Emulsión inyectable. **DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:** La vacuna se administra a cerdos de 3 semanas de edad o mayores mediante una inyección intramuscular con una dosis de 2 ml. **CONTRAINDICACIONES:** Ninguna. **REACCIONES ADVERSAS:** Se han observado reacciones sistémicas inmediatas en animales a los que se les ha administrado el producto. Es conveniente disminuir al máximo la manipulación de los cerdos y asegurarse de que la ventilación sea adecuada antes de iniciar la vacunación. Un número importante de cerdos puede experimentar una inflamación temporal en la zona inyectada. Esta inflamación debe remitir sin tratamiento alguno en menos de 20 días. Si ocurre una reacción alérgica, tratar al animal con epinefrina. **ADVERTENCIAS:** Advertencias para uso en animales: Vacune únicamente a animales sanos. La seguridad de este producto no ha sido establecida durante la gestación o la lactancia. **Advertencias que debe tomar la persona que administra el producto médico de uso veterinario a los animales:** Se debe tener cuidado para evitar inyectarse en los dedos, manos u otras partes del cuerpo. Una inyección accidental puede provocar reacciones locales serias. Consulte a un médico de inmediato. **Interacción con otros productos médicos y otras formas de interacción:** No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con cualquier otro medicamento de uso veterinario. Por lo tanto, la decisión de usar esta vacuna antes o después de cualquier otro medicamento veterinario se debe tomar dependiendo de cada caso. **Incompatibilidades:** No se conocen. **Precauciones de Almacenamiento:** Consérvese entre 2 y 7 °C. No congelar. Protéjase de la luz. Una vez abierto el envase, utilice todo su contenido Manténgase fuera de la vista y el alcance de los niños y de los animales domésticos. Deseche el frasco y sobrantes mediante incineración. **TIEMPO DE RETIRO:** 21 días. **PRESENTACIONES:** 100 ml/50 dosis. **PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:** Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos. Pregunte a su Médico Veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente. **INFORMACIÓN ADICIONAL:** Para uso veterinario exclusivamente. CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO. **ELABORADO POR:** Intervet Inc., Omaha NE 68103, USA. **IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:** Intervet México, S.A. de C.V. Av. San Jerónimo 369, Colonia. La Otra Banda, Álvaro Obregón, C.P. 01090, Ciudad de México. www.msd-salud-animal.com.mx



# Porcilis® ILEITIS

LA PRIMERA VACUNA INECTABLE  
DEL MUNDO CONTRA  
*Lawsonia intracellularis*



Reg. SAGARPA B-0273-282

## LA ILEÍTIS

La ileítis es una enfermedad bacteriana de gran importancia en el cerdo (junto al PRRS, Micoplasma o Circovirus), que provoca enormes pérdidas económicas para el poricultor.

Los animales infectados con *Lawsonia intracellularis* a menudo no presentan grandes evidencias clínicas (la forma más habitual es subclínica), pero sí **bajos crecimientos e índices productivos**.

## LA PREVENCIÓN DE LA ILEÍTIS

La vacunación frente a *Lawsonia intracellularis* es una necesidad evidente y la alternativa moderna al uso masivo de antibióticos en el alimento, siguiendo la tendencia mundial a su reducción y las crecientes limitaciones regulatorias.

La mejor forma de controlar la ileítis es **la vacunación, uno a uno**, de todos los cerdos a partir de las 3 semanas de vida.

# LLEGAN AIRES NUEVOS EN EL CONTROL DE LA ILEÍTIS

