

## FICHA TÉCNICA

### PORCILIS<sup>®</sup> APP

Reg. SAGARPA B-0273-086

#### USO VETERINARIO

1

#### PARA LA INMUNIZACIÓN DE CERDOS SANOS CONTRA LA PLEURONEUMONÍA PORCINA CAUSADA POR *Actinobacillus pleuropneumoniae*

##### FÓRMULA:

Cada dosis de 2 ml contiene:

Antígeno concentrado de <i>Actinobacillus pleuropneumoniae</i> *	600 mg
Vehículo c.b.p.	2 ml

\*Los ingredientes activos con 4 antígenos, los cuales cubren el espectro de todos los serotipos conocidos de *A. pleuropneumoniae*. Todos los serotipos contienen el antígeno OMP (Proteína de Membrana Externa), y expresan al menos una de las 3 toxinas termolábiles de proteína natural (ApI, hemolisina tipo I, ApII, hemolisina tipo II y ApIII, toxina de macrófago). Cada dosis de vacuna contiene 50 Unidades de cada uno de estos 4 antígenos.

##### DESCRIPCIÓN:

**PORCILIS<sup>®</sup> APP** es una vacuna subunitaria, inactivada y suspendida en adyuvante Diluvac<sup>®</sup> Forte para la inmunización de cerdos sanos contra la pleuroneumonía porcina causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*

##### INDICACIONES:

Para la inmunización de cerdos sanos contra la pleuroneumonía porcina causada por *Actinobacillus pleuropneumoniae*.

##### ESPECIES DESTINO:

Porcinos (engorda).

##### FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión inyectable.

##### DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 inyecciones de 2 ml c/u; la primera por vía subcutánea en el pliegue de la pierna y la segunda por vía intramuscular profunda detrás de la oreja.

##### PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

La máxima protección deberá lograrse antes del inicio del período de engorda. Los cerdos pueden ser vacunados desde las 6 semanas de edad. Se requieren dos vacunaciones con un intervalo mínimo de 4 semanas entre sí. Se recomienda aplicarlas a la 6ª y 10ª semanas de edad. Es conveniente suspender el alimento 12 horas antes de la vacunación.

##### CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Agítese bien antes de usar y durante la vacunación.

##### CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

#### REACCIONES ADVERSAS:

Los cerdos pueden mostrar fiebre moderada, apatía y falta de apetito. Ocasionalmente puede ocurrir vómito. En algunos animales puede llegar a presentarse inflamación ligera en el sitio de aplicación. Estas reacciones desaparecerán dentro de las 24 horas posteriores a la aplicación de la vacuna.

#### ADVERTENCIAS:

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

#### PRECAUCIONES ESPECIALES:

***Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:***

Mantenga el producto en su empaque original hasta que se utilice para evitar que los niños tengan acceso directo al mismo.

No comer, beber o fumar mientras esté manipulando el producto.

Lávese las manos cuidadosamente con agua y jabón inmediatamente después de utilizar el producto.

***Gestación, lactancia y fertilidad:***

No aplica.

***Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:***

Ninguna conocida.

***Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):***

Con una dosificación doble no se observaron otros síntomas diferentes a los de una sola dosis.

***Incompatibilidades:***

No se recomienda mezclar con ninguna otra vacuna o producto médico veterinario.

***Precauciones de Almacenamiento:***

Consérvese entre 2 y 8°C.

No congelar.

#### PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

#### PRESENTACIONES:

Frascos con 100 ml (50 dosis).

#### PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

#### INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

**CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.**

#### ELABORADO POR:

**Intervet International, B.V.**

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

#### IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

**Intervet México, S.A. de C.V.**

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.