

FICHA TÉCNICA

PORCILIS[®] Ery+Parvo+Lepto

Reg. SAGARPA B-0273-281

USO VETERINARIO

1

VACUNA INACTIVADA CONTRA LA ERISIPELA, PARVOVIROSIS Y LEPTOSPIROSIS EN CERDOS

FÓRMULA:

Cada ml contiene:

Cepas inactivadas de:

<i>Erysipelotrix rhusiopathiae</i>	≥ 1RP*
Parvovirus porcino	≥ 65 U/ml
Leptospira serogrupos:	
Canicola (serovar Portland-Vere)	≥1408 U/ml
Icterohaemorrhagiae (serovar Copenhageni)	≥105 U/ml
Australis (serovar Bratislava)	≥ 852 U/ml
Grippotyphosa (serovar Dadas)	≥ 324 U/ml
Pomona (serovar Pomona)	≥ 83 U/ml
Tarassovi (serovar Gatuni)	≥138 U/ml
Acetato de dl- α -tocoferol	71.3-78.8mg/ml
Vehículo c.b.p	1 ml

*equivalente a dpp (dosis de protección para porcinos).

DESCRIPCIÓN:

Porcilis[®] Ery+Parvo+Lepto es una vacuna contra la erisipelosis porcina causada por *Erysipelothrix rhusiopathiae*, previene los problemas reproductivos causados por parvovirus porcino (PPV) y los siguientes serogrupos de *Leptospira*: *L. interrogans* serogrupo Canicola, *L. interrogans* serogrupo Icterohaemorrhagiae, *L. interrogans* serogrupo Australis (Bratislava), *L. kirschneri* serogrupo Grippotyphosa, *L. interrogans* serogrupo Pomona, *L. santarosai* serogrupo Tarassovi.

INDICACIONES:

Para la inmunización activa de cerdas multíparas y nulíparas:

- Contra problemas reproductivos provocados por parvovirus porcino y *Leptospira* serogrupo *Pomona* serovar Pomona.
- Para reducir los síntomas clínicos provocados por *Erysipelotrix rhusiopathiae* y *Leptospira* serogrupo *Canicola* serovar Canicola y serogrupo *Pomona* serovar Pomona.
- Para reducir la infección provocada por *Leptospira* serogrupo *Canicola* serovar Canicola, *Leptospira* serogrupo *Icterohaemorrhagiae* serovares Icterohaemorrhagiae y Copenhageni, *Leptospira* serogrupo *Australis* serovar Bratislava, *Leptospira* serogrupo *Grippotyphosa* serovares Grippotyphosa y Bananal/Liangguang y *Leptospira* serogrupo *Tarassovi* serovares Tarassovi y Vughia.

ESPECIES DESTINO:

Cerdas (multíparas y nulíparas).

FORMA FARMACÉUTICA:

Suspensión Inyectable.

DOSIS Y VÍA DE ADMINISTRACIÓN:

Administrar 2 ml por vía intramuscular.

PROGRAMA DE VACUNACIÓN:

- Vacunación básica:** En cerdas que no han sido vacunadas con **Porcilis[®] Ery + Parvo + Lepto** deben aplicar una primera inyección de 6 a 8 semanas antes de la fecha prevista para la inseminación y una dosis de refuerzo 4 semanas más tarde.
- Revacunación:** Se administra una dosis de **Porcilis[®] Ery + Parvo + Lepto** una vez al año, suplementada con un producto que contenga *Erysipelotrix rhusiopathiae* 6 meses después de cada vacunación con **Porcilis[®] Ery + Parvo + Lepto** para mantener la inmunidad contra *Erysipelotrix rhusiopathiae*.
- Inicio de la inmunidad:** *Erysipelotrix rhusiopathiae*, 3 semanas.
Parvovirus porcino, 10 semanas.
Serogrupos de *Leptospira*, 2 semanas.
- Duración de la inmunidad:** *Erysipelotrix rhusiopathiae* y *Leptospira* serogrupo Australis: 6 meses.
Parvovirus porcino, *Leptospira* serogrupos *Canicola*, *Icterohaemorrhagiae*, *Grippotyphosa*, *Pomona* y *Tarassovi*, 12 meses.

CONSEJOS PARA LA ADMINISTRACIÓN CORRECTA:

- Antes de aplicar el producto, permita que la vacuna alcance la temperatura ambiente (18 a 25 °C).
- Agite antes de usar y durante la vacunación.
- Evite su contaminación.

CONTRAINDICACIONES:

Ninguna.

REACCIONES ADVERSAS:

Puede presentarse un incremento transitorio de la temperatura corporal de 0.5 °C hasta dos días después de la vacunación. Se pueden observar reacciones locales en el área de aplicación las cuales son transitorias.

ADVERTENCIAS:

Vacune únicamente animales sanos.

Manténgase fuera del alcance de los niños y de los animales domésticos.

PRECAUCIONES ESPECIALES:

Precauciones que debe tomar la persona que administra el producto veterinario a los animales:

En caso de inyectarse accidentalmente, consulte de inmediato a un médico y muéstrelle el instructivo o la etiqueta.

Gestación, lactancia y fertilidad:

Puede usarse durante la gestación y lactancia.

Interacción con otros medicamentos y otras formas de interacción:

No existe información disponible sobre la seguridad y eficacia de esta vacuna cuando se utiliza con otros productos medicinales de uso veterinario. Por lo tanto, la decisión de utilizar esta vacuna antes o después de cualquier otro producto medicinal de uso veterinario debe tomarse basándose en cada uno de los casos.

Sobredosis (síntomas, procedimientos de emergencia y antídotos):

Igual que si se tratase de una dosis única (reacciones adversas).

Incompatibilidades:

No mezclar con ningún otro producto.

Precauciones de Almacenamiento:

Consérvese entre 2 y 8 °C.

No congelar ni exponer a los rayos directos del sol.

Utilice el producto durante las 10 primeras horas después de abierto el envase.

3

PERIODO DE RETIRO:

Cero días.

PRESENTACIONES:

Frascos con 20 ml (10 dosis).

Frascos con 100 ml (50 dosis).

PRECAUCIONES PARA LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO NO UTILIZADO O LOS MATERIALES DE DESECHO:

Los medicamentos no deben eliminarse en aguas residuales ni junto con los desperdicios domésticos.

Pregunte a su médico veterinario cómo desechar los medicamentos que ya no se requieren. Estas medidas deben ayudar a proteger el medio ambiente.

INFORMACIÓN ADICIONAL:

PARA USO VETERINARIO EXCLUSIVAMENTE.

CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO.

ELABORADO POR:

Intervet International, B.V.

Wim de Körverstraat 35,

5830 AA, Boxmeer,

Holanda.

IMPORTADO Y DISTRIBUIDO POR:

Intervet México, S.A. de C.V.

Av. San Jerónimo 369, Colonia

La Otra Banda, Álvaro Obregón,

C.P. 01090, Ciudad de México.